


کاتتر یا شالدون چیست ؟

لوله ورید مرکزی یا کاتتر ، لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن یا شانه داخل سیاهرگ مرکزی گردن شما قرار میگیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد . نوع دائم حداکثر تا یکسال استفاده می شود و نوع موقت حداکثر تا یکماه قابل استفاده است برای انجام همودیالیز ما به دو رگ نیاز داریم این لوله دو شاخه دارد از یک شاخه خون از بدن شما خارج می شود و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می شود و از شاخه دیگر ، خون تصفیه شده وارد بدن شما می شود



نحوه گذاشتن لوله ورید مرکزی :

در صورت امکان شب قبل از عمل لوله گذاری حمام نمایید عمل کاتتر گذاری در اتاق عمل به صورت سرپایی و بدون بی هوشی با بی حسی موضعی انجام می شود

بعد از بی حسی ، از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتر تا نزدیکی قلب هدایت می شود و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می شود این سر که دو شاخه است همیشه باید توسط پیچ های استریل بسته باشد و فقط پرستار دیالیز به وسیله آن شما را به دستگاه دیلیز وصل می کند

مراقبت های پس از نصب کاتتر :

یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر عفونت است برای پیشگیری از عفونت نکات زیر را رعایت کنید

- ۱) دستهای خود را مخصوصا پس از توالت با آب و صابون بشویید
- ۲) از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید
- ۳) پانسمان کاتتر را خیس نکنید
- ۴) بعد از حمام کردن پانسمان را تعویض کنید
- ۵) پانسمان را در منزل و به صورت غیر استریل تعویض نکنید
- ۶) هیچ نوع پمادی را بدون اجازه پزشک روی کاتتر نمالید
- ۷) مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود
- ۸) هرگز پیچ های دو شاخه را دستکاری نکنید و اگر باز شد سریع ببندید
- ۹) هرگز بست های آبی و قرمز را دستکاری نکنید و اگر باز شد فوراً ببندید
- ۱۰) مصرف هر گونه داروی تزریقی یا خونگیری از طریق کاتتر ممنوع است
- ۱۱) اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن شما خارج گردید سعی نکنید آن را سرچایش برگردانید و محل آن را با یک گاز استریل ۲۰ دقیقه فشار دهید
- ۱۲) شما و پرستارتان هر دو ملزم به استفاده از ماسک هستید

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به مرکز درمانی خود مراجعه کنید :

- ۱) تب و لرز



واحد آموزش

- ۲) قرمزی ، التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله ورید مرکزی به پوست
- ۳) تورم دست یا بازو
- ۴) عدم کارایی در حین دیالیز
- ۵) اگر بخیه های لوله باز شوند یا لوله از محل خود بیرون آید بدون آنکه برای بازگرداندن لوله به جای خود تلاش کنید ، فوراً یک گاز استریل روی آن بگذارید ، روی آن چسب محکمی بزنید و به مرکز درمانی مراجعه کنید

منبع :

دفترچه راهنمای ثمین طب سروش

دیالیز و مراقبتهای پرستاری

نحوه مراقبت از خود در کاتتر یا شالدون



با آرزوی سلامتی